



Ordre : Pezizales

Famille : Pezizaceae

## ***Peziza succosella*** (Le Gal & Romagn.) Mos.

Sur sol, parfois sur lieux brûlés. Hyménium brun olive, brun-gris à brun-noir avec tonalités rougeâtres. Chair exsudant un lait jaune. Spores 15-18 x 9-10 µm ornées de verrues irrégulières et grossières, généralement avec une guttule centrale. Base asques sans crochets. A comparer avec les autres pézizes à lait jaune :

- *P. michelii* et *P. berthetiana* : teintes différentes, rougeâtre, lilas, vineux...;
- *P. succosa* : hyménium souvent plus clair, spores plus grandes avec deux guttules et verrues plus fortement allongées ;
- *P. infusata* : taxon peut-être superflu décrivant des pézizes à hyménium rouge-brun à brun foncé noirâtre, spores 16-18 x 9-10 µm à deux guttules.

Pézize visible presque chaque hiver entre novembre et février (une récolte en avril), aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Elle reste néanmoins peu fréquente et seul un contrôle microscopique peut confirmer l'espèce. Malgré tout, les teintes sombres de l'hyménium peuvent déjà faire envisager ce binôme sur le terrain car son sosie, *P. succosa*, présente des teintes générales bien plus claires et semblerait plus présent l'été et l'automne.

Biblio : Icône Boudier 277 - Ascomiceti Italia Medardi - Clé des discomycètes carbonicoles par R. Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner.

***Fiche réalisée en avril 2022 par Patrice TANCHAUD***

Ste Gemme, nov. 2013



