



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## ***Lactarius pterosporus*** Romagnesi

Nom français : Lactaire à spores ailées

Surtout sous hêtres, chênes et charmes argilo-calcaires. Chapeau brun grisâtre, velouté, souvent très ridé au disque. Lames crème ochracé, serrées. Stipe crème ochracé. Lait blanc, puis rose sur les lames, âcre. Spores 7-9 x 6-8  $\mu\text{m}$ , typiquement à fortes crêtes formant des « ailes » remarquables. A comparer avec :

- *L. ruginosus* : marge très cannelée ;
- *L. fuliginosus* spores non ailées ;
- *L. romagnesii* : chapeau brun très sombre, spores réticulées ;
- *L. subruginosus* : sous hêtres, chapeau maculé de blanc, odeur de coco, taxon non retenu par quelques auteurs récents car probable synonyme de *L. pterosporus* et *L. ruginosus* selon les récoltes.

Ce lactaire est visible presque chaque année, souvent dès le mois de juin, puis l'été et l'automne. Un contrôle microscopique s'avère parfois indispensable pour le distinguer des espèces proches à lait rosissant, notamment *L. azonites* et *L. fuliginosus*.

Biblio : littérature courante.





