



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius splendificus Chevassut & R. Henry

Surtout sous chênes verts sur sol calcaire. Chapeau visqueux, jaune fauve à brun olivâtre plus ou moins teinté de lilacin et de pourpre, puis de cuivré purpurin, parfois avec des restes de voile brunâtre au centre. Lames jaune olivacé à jaunâtre moutarde, parfois avec l'arête violacée. Stipe jaune olivacé teinté de violacé, avec un bulbe marginé à rebord brun vineux. Chair jaune, souvent violette dans le cortex du stipe. Odeur fruitée, saveur douce. KOH subnul sur cuticule et brun sur chair selon l'ADC, mais selon nos propres observations, brun acajou à rouge pourpre sur cuticule et bulbe, rosâtre sur chair. Spores 9-11 x 5,5-6,5 µm.

Magnifique cortinaire de la Ss.-section *Splendentes*, proche de *C. atrovirens* par sa chair jaune, mais à cuticule moins sombre et réactions macrochimiques différentes. C'est avec notre ami André Merlet que nous l'avons déniché en 2009 dans les bois du Douhet, notre collègue nous communiquant le soir même le résultat de sa détermination et la joie de la découverte de ce rare taxon. A ce jour, nous le connaissons surtout sur cette station où il apparaît tous les ans, au mois de novembre, nous permettant d'en apprécier sa variabilité (pages 1 et 2). A noter que la fiche de notre collègue Patrick Boisselet a été réalisée à l'aide de spécimens provenant du même emplacement.

Pages 3 : plusieurs récoltes d'exemplaires moins vivement colorés provenant d'une autre station.

Biblio : ADC Bidaud et al.





3 photographies d'exemplaires rencontrés l'automne à Trizay, entre les années 2011 et 2018, la cuticule est moins vivement colorée.