



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Hymenogasteraceae*

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet

Nom français : Hébélome à centre sombre

Sous feuillus ou conifères. Chapeau cocardé, brun à fauve, pâli au bord par des flocons vélaire. Lames beiges puis brunes. Stipe cortiné, crème à base brunissante. Saveur amère et odeur raphanoïde. Spores 7,5-10,5 x 4,5-6,8 μm , non dextrinoïdes. Cheilocystides lagéniformes à plus ou moins cylindriques.

A comparer par exemple avec *C. cistophilum* qui pousse sous cistes, à saveur douce et spores également non dextrinoïdes.

A noter l'existence d'une rare espèce parasite, *Squamanita odorata*, qui se développe parfois sur cet *Hebeloma*, elle dégage une nette odeur dite « de bonbon anglais », son chapeau est gris et squamuleux.

Bien qu'assez variable, cet hébélome semble assez facile à reconnaître, les récoltes sous saules méritent néanmoins un contrôle microscopique vu le nombre d'espèces poussant sous cette essence. Nous le rencontrons chaque année à la période automnale, plus exceptionnellement au printemps ou l'été, aussi bien sous feuillus que sous conifères.

Biblio : littérature courante - The Genus *Hebeloma* Jan Vesterholt.





