



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## ***Leccinum roseofractum*** Watling

Sous bouleaux. Chapeau brun châtain, brun grisâtre à brun rouge. Pores crème brunâtre. Stipe blanchâtre à squamules grisâtres plus ou moins sombres. Chair rosi-rougissant rapidement devenant ensuite violacé sale, sans trace de bleu-vert à la base du stipe. Spores 16-19 x 5,5-6,5 µm.

A noter que cette espèce est synonymisée avec *L. scabrum* par H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos, qui précisent qu'elle est considérée comme extrême dans la série des plus sombres formes de *L. scabrum*, et donnent pour ce dernier une coloration de la chair pouvant être nulle à rose/rouge.

Dans l'immédiat, nous préférons malgré tout séparer ces récoltes, en nous demandant si une *forme roseofractum* de *L. scabrum* ne pourrait pas avoir sa place ... Presque chaque automne, nous rencontrons ces bolets dans le secteur de Cadeuil commune de Ste Gemme.

Biblio Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4).

*Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD*

