



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

***Myxomphalia maura var. invita*** (P. Karst.) ad. int.

Synonyme : *Myxomphalia invita*

En sous-bois, sur terre nue. Chapeau ombiliqué, brun grisâtre à argenté, hygrophane, marge striée. Lames adnées à subdécurrentes, blanches. Stipe subconcolore au chapeau. Cheilocystides lagéniformes à col plus ou moins effilé, spores 5,5-6,5 x 3,5-4,5 µm.

Récolte réalisée fin décembre 2012, en milieu sablonneux sur bord de chemin à Ronce les bains. Chapeau 15 mm, odeur et saveur nulles.

Microscopie observée : basides tétrasporiques 25-30 x 7,5 µm ; spores 6,5-7,5 x 3,5-4,5 µm légèrement amyloïdes ; cheilocystides subcylindriques à lagéniformes ; cuticule constituée d'hyphes cylindriques ; boucles présentes dans tous les tissus.

Nous remercions vivement M. P.-A. Moreau de nous avoir mis sur la piste de ce taxon.

Il est à noter qu'Antonin & Noordeloos, dans leur ouvrage « A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula ... » placent cette variété en synonymie du type, mais face à de telles différences, les distinguer nous paraît utile ...

Biblio : Guida alla determinazione dei funghi, Moser, vol. 1 - DM HS n° 4 p. 163.