



Ordre : Hymenochaetales

Famille : Coltriciaceae

Coltricia cinnamomea (Pers.)Murr.

En forêt, dans l'humus ou sur bois pourri, parfois dans les brûlis. Chapeau 1,5-4 cm, satiné brillant, zoné concentriquement et finement ridé radialement, brun rougeâtre foncé à brun rouillé puis brun cannelle ; marge mince, aiguë, entière à incisée. Stipe feutré, brun rouillé. Pores variables, plus ou moins anguleux, jaune ochracé, brunissant avec l'âge. Boucles absentes, spores 6-10 x 4,5-7 μm (dimensions variables selon les ouvrages) ; hyphes de la surface du chapeau sans ramifications dichotomiques.

A comparer avec *C. perennis* : généralement plus grand, chapeau plus terne, brun jaunâtre à grisâtre, spores légèrement moins larges, hyphes de la surface du chapeau avec de nombreuses ramifications dichotomiques.

Cette espèce nous semblait rare, ou méconnue, lors de notre première récolte (ci-dessus) réalisée en forêt, sous des écorces, sur bois pourrissant de pin, les spores mesuraient 6,5-7,5 x 4,5-5 μm . Nos nombreuses observations réalisées lors de l'été 2014 pourraient faire penser qu'il s'agirait plutôt d'une espèce estivale, affectionnant, du moins en ce qui concerne nos récoltes, les bois de châtaigniers.

Biblio : Marchand n° 319 - North American Polypores Vol. I, 1986. Gilbertson & Ryvarden - Jülich p. 268.





Combiers (16), août 2014