



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Bolbitiaceae*

Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod

Synonyme : *Agrocybe sphaleromorpha*

Nom français : Agrocybe précoce

Ecologie variable, en forêt, sur débris de bois fragmenté, dans les parterres, dans l'herbe. Chapeau brun-beige à ochracé pâle. Lames brunâtres à maturité. Stipe pâle, cordons mycéliens à la base ; anneau membraneux assez fragile avec débris de voile pouvant rester accrochés à la marge du chapeau. Odeur farineuse, saveur plus ou moins farineuse à légèrement amère. Spores 8,5-10,5 x 5-6,5 µm. A comparer avec :

- *A. xanthocystis* : sur bois mort en forêt (souvent de hêtre), chapeau brun sombre dans la jeunesse, présence de quelques cystides à contenu jaune ;
- *A. dura* : pousse dans les milieux herbeux et spores nettement plus grandes ;
- *A. rivulosa* : dans les paillis et les massifs, chapeau veiné, anneau net, spores légèrement plus grandes.

Nous pouvons rencontrer cette espèce tous les ans, au printemps et en début d'été. A noter quelques observations dès le mois de décembre, surtout sur le littoral.

Biblio : littérature courante.





