



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella prona (Fr.) Gillet

Synonyme : *P. prona* f. *picta*

Sur débris de bois ou autres détritux, parfois dans les ornières ou sur fumier. Chapeau 10-30 mm, hygrophane, strié, brun roussâtre sombre avec parfois quelques restes de voile, séchant en crème ochracé. Lames beige grisâtre puis presque noires à maturité, arête surlignée de rouge-brun. Stipe blanc crème, légèrement bulbilleux. Spores 12,5-17 x 6,5-8 µm avec un très net pg (pore germinatif). Basides souvent bisporiques. Cheilocystides lagéniformes à fusiformes mêlées à des cellules en massue, pleurocystides similaires.

A comparer avec les espèces de la Section *Atomatae*, notamment *P. potteri* à chapeau plus gris et non strié.

Cette petite psathyrelle ne semble pas rare, nous l'observons presque tous les ans à différentes périodes, un contrôle microscopique pour ce genre n'est néanmoins jamais superflu.

Biblio : littérature courante - BK4 349 - Francis Fouchier « Le Genre Psathyrella » FAMM 1995 (clés d'après Kits van Waveren) - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - GEPR.



