



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Amanita huijsmanii* Massart & Rouzeau

Sous chêne, normalement thermophile. De petite taille et plutôt grêle. Chapeau jusqu'à 4 cm, un peu mamelonné, gris d'aspect métallisé, parfois nuancé de beige, plus ou moins avec des restes de voiles en lambeaux, marge assez grossièrement cannelée. Stipe souvent assez court pour une amanite (environ le diamètre du chapeau), blanc, finement fibrilleux. Volve mince, courte à longuement vaginée. Spores 12,5-14,5 x 9-10,5 µm, nettement elliptiques.

Cf. fiche *A. argentea*, pour les espèces grises poussant sous feuillus.

Sous conifères, voir la fiche de *A. supravolvata*.

Sous chênes, avec un chapeau beige ochracé voir par exemple *A. dryophila* et *A. lividopallescens*.

Distinguer ces amanites grises n'est pas une simple affaire, l'ADN semble apporter aujourd'hui quelques prémices de solutions, mais devra-t-on y avoir recours pour chaque récolte que nous réaliserons ? Quelques « spécialistes » parfois prétentieux répondraient probablement par la négative, pensant détenir aujourd'hui une vérité au vu de quelques détails microscopiques, mais qu'en sera-t-il demain...

Biblio : F. Massart & Rouzeau, 1989, Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux 17(3) :159.