



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estades (Lannoy & Estades)

Sous bouleaux. Chapeau blanchâtre. Pores blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe blanchâtre, finement méchuleux. Chair blanchâtre, rosâtre à la coupe dans le stipe mais pas dans le chapeau, souvent bleu-vert à la base du stipe. Spores 15-20 x 4-6,5 µm.

Des récoltes à description identique, mais avec chapeau brun à brun grisâtre, sont nommées *L. cyaneobasileucum* var. *brunneogriseolum*.

A comparer sinon avec :

- *L. holopus* : stipe couvert de méchules plus ou moins laineuses, mais espèce difficile à distinguer sans un recours à la microscopie (spores plus larges) ;
- *L. nucatum* : dans les sphaignes, chair verdâtre ;
- *L. avellaneum* (parfois synonymisé avec *L. scabrum*) : chapeau et stipe pâles, chair subimmuable.

Ce bolet, pris dans son sens strict, donc avec chapeau blanchâtre, semble rare dans la région ; notre seule récolte ainsi déterminée et présentée ici a été réalisée en octobre 2014 en forêt de l'Hermitain (79).

Biblio : Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4) - GEPR.