



Ordre : Tricholomatales

Famille : Lyophyllaceae

Lyophyllum deliberatum (Britzelm.) Kreisel

Synonyme : *Lyophyllum infumatum*

En forêt. Chapeau brun ochracé à brun grisâtre, parfois pâle. Lames blanchâtres à gris bleuté, bleuissant au frottement puis noircissant. Stipe blanchâtre à gris brunâtre. Odeur et saveur nulles ou farineuses. Spores 8,5-11,5 x 5-6,5 µm, typiquement losangiques.

A comparer avec d'autres espèces noircissantes, telles que :

- *L. macrosporum* : spores similaires, port nettement tricholomoïde, chapeau ocre jaunâtre à brunâtre pâle, plutôt montagnard ;
- *L. semitale* : spores elliptiques 7-9,5 x 4,5-5,5 µm, odeur et saveur farineuses ;
- *L. maas geesterani* : spores elliptiques 4,7-5,7(7) x 2,6-3,3(3,8) µm ;
- *L. transforme* (syn. *L. trigonosporum*) : spores triangulaires 8-11 x 7-8,5 µm ;
- *L. rhopalopodium* : stipe bulbeux, spores subtriangulaires à losangiques 7-9 x 5-7 µm.

Ce lyophylle n'est pas rare dans la région, il est visible chaque automne, parfois encore tardivement l'hiver, nous le rencontrons fréquemment, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres.

Biblio : DM HS n° 5 - Pilzkompodium Band 1 Erhard Ludwig.

Fiche réalisée en novembre 2023 par Patrice TANCHAUD





