



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Thelephoraceae*

Thelephora cuticularis Berk.

Plutôt sous feuillus en milieu humide. Fructification de forme variable, résupinée ou incorporée aux éléments végétaux utilisés comme support, de consistance coriace, blanchâtre à gris chair puis gris bleuâtre à gris noirâtre, marge plus claire. Odeur assez forte, désagréable, dite de sous-bois ou médicamenteuse. Chair verdissant au KOH. Spores 8,5-13 x 7-10 μm , couvertes d'épines acérées atteignant 2 μm . Boucles absentes aux cloisons des hyphes.

A comparer avec une espèce ressemblante et également sans boucles, *T. phylacteris*, qui se distingue notamment par l'absence d'odeur désagréable et des spores légèrement plus petites, plus irrégulières et ornées d'épines plus courtes.

Espèce probablement peu fréquente, dont notre seule observation à ce jour a été réalisée en juillet 2015, en sous-bois humide sur la commune de St Savinien. L'odeur puissante et désagréable était très nette, les spores observées mesuraient 10-13 x 7-9 μm , les hyphes ne présentaient aucune boucle aux cloisons et la chair a nettement réagi en vert au contact d'une goutte de potasse (observation sur lame de verre).

Biblio : Aphylophorales ... vol. 2 Jülich - RdM, 2003,1: 63-72 Genre Thelephora in Friuli, G. Zecchin.

Fiche réalisée en juillet 2015 par Patrice TANCHAUD

