



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Boletus aestivalis (Paulet) Fr.

Synonyme : *Boletus reticulatus*

Nom français : Cèpe d'été

Surtout sous feuillus. Chapeau velouté, vite sec, variable de couleurs, brun clair à brun sombre, parfois avec tonalités rougeâtres, pouvant être craquelé en période de sécheresse (cf. page 2). Pores blancs, puis jaune verdâtre. Stipe beige brunâtre, marqué d'un réseau blanchâtre souvent en relief et descendant plus ou moins jusqu'en bas. Chair immuable. Spores 12-15 x 4-5 µm. A comparer avec :

- *B. edulis* : sur sol non calcaire, surface du chapeau plus grasse avec la marge blanche, chair sous cuticule brun rosé et réseau du stipe souvent présent au sommet seulement ;
- *Hemileccinum depilatum* et *H. impolitum* (espèces fréquemment confondues et observées dans les paniers des ramasseurs) : stipe sans réseau, pores jaunes ;
- *Butyriboletus appendiculatus* : stipe avec un réseau jaune, pores jaunes ;
- *Tylopilus felleus* : parfois fort ressemblant , gros réseau en relief sur le stipe, pores roses à maturité, saveur amère.

Dans la région, selon les conditions météorologiques, nous pouvons rencontrer ce bolet dès le mois de mai, puis l'été, et jusqu'en novembre. Il pousse majoritairement sous les chênes et les châtaigniers, exceptionnellement nous l'avons observé sous cèdres.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en juillet 2023 par Patrice TANCHAUD







Juillet 2014, sous cèdres