



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius dibaphus Fr.

Nom français : Cortinaire à deux couleurs

Souvent sous sapins (*Abies*), parfois sous chênes et hêtres. Chapeau visqueux, violacé rosâtre puis plus ou moins taché d'ochracé. Lames violacé grisâtre puis brun rouille. Stipe subconcolore au chapeau, bulbe non marginé à la base. Chair blanchâtre, violacée dans le stipe. Odeur faible, saveur amère. KOH rose pâle sur cuticule, rose vif sur chair.

A comparer avec :

- *C. sodagnitus* : chapeau souvent plus bleu, saveur douceâtre, KOH rose-rouge vif sur cuticule et nul sur chair ;
- *C. pulcherimus* : chapeau violet mauve vif peu décolorant, KOH rose-rouge vif sur cuticule et chair.

A noter l'existence de *C. nemorosus*, taxon peu connu décrit comme étant proche de *C. dibaphus*...

Ce cortinaire est probablement très rare dans notre région, nous avons la chance de pouvoir l'observer en grand nombre en forêt d'Essouverts commune de Lozay, dans une plantation d'*Abies*, où il est visible en octobre et novembre, parfois encore en décembre.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.

