



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius olidus* Lange

Synonyme : *C. cliduchus*

Nom français : Cortinaire puant

Sous feuillus. Chapeau visqueux, jaune ocre à brun ochracé, parfois olivacé, centre moucheté de ponctuations plus sombres. Lames blanc grisâtre, parfois à tonalités carnées ou lilacines, puis brun ocre à rouillées. Stipe blanchâtre avec un voile ochracé laissant des squamules dans la partie inférieure. Chair blanchâtre. Odeur typique de « barbe de maïs » à terreuse. KOH nul sur cuticule et chair. Spores 9,5-11,5 x 5-6,5 µm. A comparer avec :

- *C. cephalixus* : sosie un peu plus trapu poussant sous épicéas
- *C. decoloratus* : sous feuillus sur sol calcaire, chapeau plus pâle, odeur plus agréable ;
- *C. vitellinopes* : également sous feuillus, taxon qui ne serait séparé que par de subtiles différences d'odeur (avis personnel !)
- *C. olidoamethysteus* : sous conifères ou feuillus, teintes générales plus olivâtre verdâtre et spores plus petites, taxon non retenu dans certains ouvrages ... ;
- *C. papulosus* : sous conifères, chapeau plus rougeâtre et spores nettement plus petites ;
- *C. triumphans* : sous bouleaux, espèce assez robuste, KOH jaune sur chair.

Ce cortinaire est fréquent l'automne dans les forêts de feuillus de la région. Nous adoptons le nom qui paraît le plus approprié et retenu actuellement par la majorité d'auteurs et de collègues, avec des synonymes et des binômes proches souvent controversés.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.



