



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius duracinus Fr.

Nom français : Cortinaire à pied dur

En forêt. Chapeau hygrophane, lisse, brun-jaune à brun-roux, crème ochracé en séchant. Lames ocre roussâtre. Stipe luisant, blanc, dur, atténué à la base et plus ou moins radicant. Cortine peu abondante. Chair blanc crème, odeur insignifiante, saveur douce. Réaction faible au gaïac sur la chair, et négative à la phénolaniline. Spores 8-10 x 5-6 µm. Dans la même section *Duracini*, quelques espèces proches ressemblent fortement et sont à comparer :

- *C. dolabratus* : chapeau brun-rouge sombre voilé de blanc vers la marge, lames brun-rouge ;
- *C. raphanicus* : chapeau voilé de blanc vers la marge, odeur de rave, réaction positive de la chair à la phénolaniline et au gaïac ;
- *C. poecilochroma* : chapeau se déshydratant en cocarde, réaction positive de la chair à la phénolaniline et au gaïac.

Dans la région, ce cortinaire peut se rencontrer presque tous les ans, surtout en octobre et novembre, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Nous avons remarqué que l'odeur pouvait être plus ou moins raphanoïde, ce caractère paraissant donc bien délicat pour séparer les espèces. Il est à noter également que, conformément à la description, toutes nos récoltes sont restées inertes au gaïac et à la phénolaniline.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.



