



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius magicus Eichhorn

Synonymes probables : *C. olidovolvatus*, *C. scaurocaninus*

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, vite sec, vert olive puis brun fauve, couvert radialement de fibrilles brunes innées, présence parfois de voile blanchâtre crème sur le chapeau ou vers la marge. Lames bleu mauve à beige lilacin. Stipe bleuté, garni de fibrilles enchevêtrées, parfois denses vers la base (pseudovolve) ; bulbe conique. Chair blanchâtre à jaunâtre, bleutée au sommet du stipe. Odeur terreuse ou de barbe de maïs, saveur douceâtre. KOH brun-jaune à orangé sur la cuticule. Spores 7-9 x 4,5-5,5 µm.

A comparer avec :

- *C. glaucopus* : plutôt sous conifères, presque inodore ;
- *C. parherpeticus* (syn. *C. luhmannii*) : chapeau couvert de restes de voile crème jaunâtre, lames bleutées (épithète qui pourrait éventuellement être retenue pour quelques-unes de nos récoltes ?).

Ce cortinaire n'est pas rare, nous le rencontrons tous les ans dans nos forêts de feuillus, souvent également sous chênes verts.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.





