



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Pseudoomphalina pachyphylla*** (Fr. : Fr.) Knudsen

Synonymes : *Clitocybe incomis*, *Pseudolaccaria pachyphylla*

Nom français : Clitocybe absinthe

Sous conifères, parfois sous feuillus, aussi en milieu herbeux sur sol sableux. Chapeau 1-3 cm, hygrophane, beige brunâtre à crème grisâtre. Lames larges et épaisses, blanchâtre crème. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur farineuse, saveur typiquement farineuse et amère. Spores 8,5-11 x 5-7 µm faiblement amyloïdes.

A comparer avec *P. kalchbrenneri* à chapeau givré, lames arquées un peu décurrentes et saveur seulement farineuse.

Espèce probablement peu fréquente dans la région, mais pouvant aussi se confondre avec de nombreux champignons de tous genres aux teintes plus ou moins similaires (*Clitocybe*, etc.) ; sur le terrain, les lames, l'odeur et la saveur doivent mettre sur la piste. Nous l'avons observée à plusieurs reprises, sous conifères et en milieu ouvert, par exemple à St Romain de Benet, St Sulpice d'Arnoult, Ste Gemme et Brigueuil.

Biblio : Funga nordica - GEPR.





