



Ordre : *Lachnocladiales*

Famille : *Lachnocladiaceae*

## *Asterostroma medium* Bresadola

Synonyme : *A. cervicolor* ss. auct.

Sur bois mort de conifères. Fructification résupinée, pelliculaire, feutrée, crème à ochracé saumoné, marge indéterminée avec quelques rhizomorphes. Spores 6-7,5 x 4-5,5 µm, anguleuses, amyloïdes, avec des verrues coniques de 1,5-2 µm. Gléocystides fusiformes. Présence de soies en étoile (astérophyses) typiques du genre où la délimitation des espèces passe par une observation rigoureuse des spores (anguleuses ou rondes, avec épines ou verrues), voir par exemple la fiche d'*A. ochroleucum*.

Espèce probablement peu fréquente dont nous signalons quatre observations :

- ci-dessus à gauche, janvier 2017, leg. Robert Lagarde, à Bouteville (16) sur un ancien volet en pin ;
- ci-dessus à droite, mars 2017, à Brigueuil (16) sur *Douglas* ou *Picea Abies* ;
- page 2, avril 2017 à Salles sur mer sur orme ou frêne ; page 3, avril 2017, à Saintes sur une planche de conifère.

Biblio : BK2 290 - Bull. SMF 113 (1997) p. 269-301- Corticiaceae Bernicchia & Gorjón.



