



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

## *Agaricus cf. semotus* Fr.

Synonymes : *A. dulcidulus*, *A. purpurellus*

En forêt ou en lisière. Chapeau 2-5 cm, pâle, plus ou moins couvert de fibrilles ou mèches purpurines, surtout au centre. Lames rosâtres, brunes à maturité. Stipe blanchâtre, anneau fragile. Chair jaunissant légèrement. Odeur anisée mêlée d'amande amère. Spores 4,5-6 x 3,5-4 µm.

Une étude récente de la Section *Minores*, à laquelle appartient ce taxon, est parue dans le tome 2 de L.A. Parra Sanchez, elle présente une complexité difficile à suivre et dans l'immédiat nous préférons suivre la dernière version du GEPR (ouvrage de MM Eyssartier & Roux). A comparer avec :

- *A. luteomaculatus* : spores 5,5-6,5 x 4-5 µm ;
- *A. brunneolus* : plus gros, chapeau couvert de fibrilles brun purpurin, odeur d'amande amère.

Nous restons donc prudent quant à la détermination de nos récoltes, mais il nous paraît indispensable de présenter au moins un représentant de cette Section, car de tels petits agarics ne sont pas rares dans la région, l'été et surtout l'automne, aussi bien sous feuillus, sous conifères ou en milieux herbeux.

Biblio : littérature courante - GEPR.



**cheilos**

