



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

Coprinus comatus (Müll. : Fr.) Pers.

Nom français : Coprin chevelu

Sur les bords de routes, dans les jardins ou les friches, etc. Chapeau blanc, couvert de grosses mèches blanches ou brunâtres. Lames rapidement noires. Stipe blanc, annelé dans la moitié inférieure. Odeur faible. Spores 9-13 x 6-7,5 µm avec un pg (pore germinatif) assez net et plus ou moins central.

A comparer avec :

- *C. levisticolens* : sur sol sablonneux, chapeau plus squamuleux de brun, stipe très radicaire, odeur de chicorée, spores à pg net et excentré ;
- *C. calyptratus* (syn. : *C. vosoustii*) : sur sables maritimes, chapeau subglobuleux, stipe sans anneau et spores nettement supérieures (16-19 x 11-12 µm) ;
- *C. xerophilus* : thermophile, typique des lieux secs.

Attention également à *Coprinopsis stangliana* qui pousse dans les prairies sèches, son chapeau est non méchuleux mais seulement voilé, son stipe ne porte pas d'anneau et ses spores sont ovoïdes avec un pg moins visible.

Espèce très commune, parfois présente dès le printemps ou l'été, mais surtout entre septembre et novembre, souvent visible dans les friches et sur les bords de routes, mais aussi dans les milieux incendiés ou dans les ronds-points aménagés, etc.

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Ul'jé - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés par M. Citérin).





