



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula nuragica Sarnari

Sous chênes sur sol calcaire. Chapeau bariolé aux teintes variables, mauve bleuté plus ou moins taché de rose (pour son aspect le plus typique), mais aussi avec des tons ocre grisâtre ou jaunâtres, parfois même totalement jaune. Cuticule séparable jusqu'à mi-chapeau. Lames blanchâtres puis jaunes à maturité, interveinées. Stipe blanc, grisonnant, parfois avec la base rousse. Saveur presque douce, à peine âcre. Odeur faiblement fruitée. Réaction positive au gaïac sur stipe et lames, mais pas très rapide. Fer rose orangé sur stipe. Sporée 4b-4c. Spores 8-10 x 6,5-8 µm presque totalement réticulées. Cuticule constituée de fins poils cloisonnés et de dermatocystides non cloisonnés, non incrustées, réagissant à la sulfovanilline.

Russule peu fréquente et rarement signalée, décrite seulement en 1986, placée dans la Sous-section *Integriforminae*. Nous avons retrouvé les caractéristiques de cette espèce à l'occasion de nos trois récoltes (toutes sous chênes verts) : couleur sporée, stipe légèrement grisonnant, âcreté peu perceptible, plus microscopie :

- ci-dessus : Sablonceaux en juin 2013. - Page 3 : Soulignonne en juillet 2021.
- Page 2 : St Savinien en novembre 2023.

Biblio : littérature courante - *Russula Sarnari*.



