



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Dermolomataceae*

Hodophilus phaeophyllus (Romagn.) Arauzo & P. Iglesias

Synonymes : *Camarophyllopsis hymenocéphala*, *C. phaeophylla*

A terre. Chapeau 7-20 mm, brun, pâissant. Lames gris-brun, décurrentes. Stipe plus ou moins subconcolore au chapeau, parfois ponctué au sommet (mais nettement moins contrasté que chez *H. atropunctus*, avec lequel il pourrait alors se confondre). Odeur et saveur sans particularité. Spores 4-4,5 x 3,5-4,5 µm. Cuticule constituée d'éléments clavés à piriformes. Cheilocystides absentes.

A comparer avec *H. phaeoxanthus* qui possède un stipe teinté de jaune, notamment au sommet sur jeunes exemplaires.

Cette espèce n'est pas très fréquente, nous l'avons rencontrée malgré tout à plusieurs reprises, l'automne et l'hiver, dans différents secteurs à Saintes, St Georges des Coteaux et La Chapelle des Pots. A noter que les deux récoltes d'exemplaires très sombres, présentées en bas de page 2, ont fait l'objet d'une étude phylogénétique, elles s'avèrent proches de *H. phaeophyllus* et semblent appartenir à une espèce non décrite.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 5 - Funga nordica - Errotari 2018 - Mycological Progress (2020) 19:111-125.

