



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius aprinus Melot

Synonymes : *C. suillonigrescens* (invalide), *C. strenuipes* ss. auct.,

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau panaché de gris-brun, brun-rouge à brunâtre, souvent taché, fortement vergeté de fibrilles innées. Lames brunâtres, parfois violetées, rouillées à maturité. Stipe massif, couvert d'un voile blanchâtre détersile, laissant apparaître le fond concolore au chapeau. Chair ferme, grisâtre, marbrée de teintes ferrugineuses. Odeur sans particularité. Spores 8,5-11 x 6-7 µm.

Les cortinaires de la Section *Sericeocybe*, série *Sordescens* où est placé ce taxon, restent encore à débrouiller, ils sont délicats à étudier en raison des différents aspects qu'ils peuvent prendre en fonction de l'âge et des conditions météorologiques. A comparer par exemple avec :

- *C. suillus* : semble être un taxon à part aux teintes rosâtres, appartenant peut-être à un autre groupe... ;
- *C. subferrugineus* : difficile à distinguer mais paraissant différemment interprété selon les auteurs ;
- *C. sordescens* (peut-être synonyme ?) : posséderait des teintes plus ternes ;
- *C. diffractosuavis* : souvent sous chênes verts, odeur agréable et puissante de frangipane ou d'alcool de poire.

Cortinaire assez répandu dans la région, mais différemment nommé selon les époques, les détermineurs et la littérature utilisée.

Biblio : Flora photographica - ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en février 2024 par Patrice TANCHAUD



