



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Bolbitiaceae*

Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc.

Synonyme : *Panaeolus subbalteatus*

Nom français : Panéole à marge zonée

Plus ou moins en touffe sur tas de fumier, paille pourrie. Chapeau 3-12 cm, brun rougeâtre, crème roussâtre à cuivré orangé, hygrophane et pâlisant par zones concentriques, marge typiquement blanchâtre sur exemplaires frais. Lames crème brunâtre puis brun rougeâtre à brun noirâtre. Stipe pruineux à fibrilleux longitudinalement, crème, et brunâtre surtout à la base ou à la manipulation. Spores 12-15,5 x 6,5-9,5 µm, elliptiques à citriformes. Chrysocystides absentes.

Ce panéole semble assez bien caractérisé par sa macroscopie et son écologie. Néanmoins, en présence d'une microscopie à peu près identique, quelques auteurs n'hésitent pas à synonymiser *P. dunensis*, point de vue que nous ne partageons pas vu la petite taille et l'habitat spécifique et totalement différent de ce dernier.

Nous observons occasionnellement cette espèce, typiquement sur vieux tas de fumier où elle peut apparaître du printemps à l'automne lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

Biblio : Bk4 311 - Pilzk. 1 - Funga nordica.

