



Bryoscyphus sp. 2

Ascomycète apparemment non décrit à ce jour, selon discussion générée sur le forum Ascofrance. Notre récolte a été réalisée en mars 2018, dans une vigne sur la commune de Corme-Royal. Plusieurs centaines d'exemplaires étaient greffés sur *Anthoceros*, communément appelé Hornwort de champ, bryophyte devenu rare, et de l'avis de spécialistes il s'agirait ici de *A. agrestis* ou *A. punctatus*.

Apothécies 1-3 mm, blanchâtres à crème rosâtre, évasées, marge souvent irrégulière à maturité, devenant orange sur exsiccatum.

Microscopie :

- spores (10)13-16(18) x (3)3,5-4,8(5) μm , hyalines, allongées, irrégulières, avec deux ou trois guttules un peu plus grosses et quelques-unes plus petites, parfois avec une cloison centrale (probablement à complète maturité) ;
- asques 77-92 x 9,5-10,5 μm , IKI négatif, base avec crochet ;
- paraphyses filiformes garnies de guttules peu réfringentes.

A noter une certaine ressemblance avec *B. dicrani*, espèce fasciculée qui possède des spores un peu losangiques et plus grandes, ainsi que des paraphyses garnies de guttules nettement réfringentes.