



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini et coll.

Synonyme : *Boletus queletii*

Nom français : Bolet de Quélet

Sous feuillus. Chapeau velouté brun orangé à brun-rouge, parfois avec des teintes cuivrées ou olivâtres. Pores orangés, bleuissants. Stipe jaune clair couvert de fines granulations, base typiquement rouge betterave. Chair jaune pâle, bleuissante. Spores 10-13,5 x 5-6,5 µm.

Il est possible de trouver dans la littérature différentes variétés de ce bolet (*var. rubicundus* (syn. *var. lateritius*), *var. subluridus* par exemple), mais elles semblent bien difficiles à distinguer tant le type nous paraît « tout simplement » variable. Page deux, nous présentons des exemplaires totalement jaunes que nous nommions auparavant *Boletus queletii var. discolor*.

S. luridus est une espèce proche qui s'en distingue notamment par la présence d'un réseau sur le stipe.

Ce bolet est fréquent, nous le rencontrons dès le mois de mai, puis les mois d'été si les conditions de pluviométrie sont favorables, et jusqu'en novembre.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en avril 2019 par Patrice TANCHAUD



Page 2, trois photographies rappelant *Boletus queletii* var. *discolor*, variété peu reconnue de nos jours et non versée dans le genre *Suillellus*. Observer de tels exemplaires entièrement jaunes (sauf la base du stipe qui est rouge betterave) n'est pas fréquent. Attention également à *N. junquilleus*, taxon proche de *N. erythropus*, qui se distingue par sa chair très jaune, son stipe ponctué de fines granulations, et la base du stipe non rouge betterave.

