



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Otideaceae*

## ***Sowerbyella radiculata*** (Sow. : Fr.) Nannf.

Au sol, dans la litière ou sur débris végétaux, sous conifères ou feuillus. Apothécies souvent irrégulières. Hyménium jaune ochracé à jaune moutarde, face externe pruveuse. Stipe blanchâtre plus ou moins long. Spores (10)12-16,5 x 6-8,2  $\mu\text{m}$ , biguttulées, verruqueuses à maturité, avec un réseau complet ou presque.

A comparer avec :

- *S. crassisculpturata* : différences macroscopiques (plus sombre, marron à ochracé roussâtre) et microscopiques (spores crêtées et subréticulées) bien ténues, taxon d'ailleurs synonymisé par quelques auteurs ;
- *S. imperialis* : hyménium jaune plus ou moins fauve, spores constituées de verrues anastomosées se réunissant en courtes crêtes (pas de réseau complet) ;
- *S. rhenana* : hyménium jaune orange, spores 20-24 x 10-12  $\mu\text{m}$  fortement réticulées.

Ascomycète peu fréquent, nous l'avons observé à quelques reprises entre les mois de novembre et mars, par exemple sur les communes de Souligonne, Bords, Lozay et Saintes ; avec une écologie variable, sous feuillus, conifères (*Abies*, *Cupressus*) et en milieu brûlé.

Biblio : Medardi p. 269 - Cetto n° 2551 - Moravec, Mycologia Helvetica vol 1 n° 6, 1985, p 427-442.







