



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Crepidotaceae*

## *Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Saccardo

Synonyme : *Crepidotus applanatus* var. *fulvifibrillosus*

Sur bois mort. Chapeau feutré, brun fauve. Lames orangées au départ, se décolorant rapidement. Stipe absent. Odeur sans particularité. Spores 6-7  $\mu\text{m}$ , globuleuses et finement verruqueuses.

A noter que des exemplaires âgés peuvent être confondus avec *Lignomyces* (ou *Pleurotus*) *vetlinianus*, très rare espèce à chapeau hirsute dans la jeunesse puis à peine pubescent, à sporée blanche, d'odeur forte légèrement rance, qui possède des spores largement elliptiques (7,5-8,5 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$ ).

Belle et remarquable espèce lorsqu'elle est jeune, fréquente sur nos terrains de prospections, notamment sur peuplier. A part l'hiver, il est possible de la rencontrer assez souvent lorsque les conditions sont favorables puisque nous avons noté sa présence tous les mois entre avril et novembre.

Nous signalons une récolte réalisée sur pin, en forêt de La Palmyre, en novembre 2010 (cf. page 2).

Biblio : bull. SMMA n° 16 - Genere Crepidotus Europa Consiglio & Setti.







