



Ordre : Polyporales

Famille : Meripilaceae

Abortiporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev

Sur bois mort au sol, en milieux humides. Fructifications blanchâtres, stipitées. Pores fins à peine visibles à l'œil nu. Spores 4,5-6,5 x 3,5-5 µm, boucles présentes aux cloisons des hyphes.

Nous connaissons ce champignon depuis de nombreuses années sur différentes stations en milieux humides, souvent avec présence d'aulnes, dans les secteurs de Saintes, Fontcouverte, La Chapelle des Pots, La Gripperie, St Sornin, dans le département de la Charente ... Cette espèce est donnée rare dans la littérature mais elle est bien présente sur nos lieux de prospection habituels, généralement dès le mois de juillet jusqu'en novembre. Il est à noter que nous avons perçu, sur certains exemplaires, une nette odeur cyanique (cf. *Clitocybe gibba*), mais absente sur d'autres récoltes. La microscopie nous a montré des spores conformes à la littérature, mesurant 5-5,5 x 3,5-4,5 µm, et des boucles présentes aux cloisons des hyphes.

Biblio : Polyporaceae Bernicchia (clé).

Fiche réalisée en février 2016 par Patrice TANCHAUD

