



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius rapaceotomentosus Delaporte & Eyssartier

Description : Chapeau charnu de 5 à 10 (15) cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe à marge enroulée ; cuticule moite puis rapidement sèche, feutrée, à marge laineuse, remarquablement ornée d'un voile blanc inné et persistant au disque ; couleur crème rapidement maculée de taches roussâtres, réaction rosâtre pâle à la potasse; stipe peu élancé, blanchâtre devenant ocracé, à bulbe blanc, large et marginé parfois subvolvacé ; lames assez serrées, d'abord beige pâle à reflets bleuâtres inconstants puis argillacées enfin rouillées ; chair blanchâtre mais gris-perle à la moelle du stipe, à forte odeur chocolatée puis caoutchoutée ; réaction subnulle à la potasse (rosâtre sale) ; spores 10-11,5 x 6-7 µm.

Récoltes : en 2009-2010 et 2011 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à Soullignonnes et Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Remarques : ce cortinaire est remarquable par son port massif, son revêtement feutré envahi de taches roussâtres et sa forte odeur chocolatée ; il peut être confondu avec *C. rapaceoides* qui pousse en mélange et qui exhale la même odeur mais qui diffère par un chapeau plus convexe et régulier à cuticule lisse et visqueuse. *C. osmophorus* est le sosie parfait de *C. rapaceotomentosus* mais à odeur de fleur d'oranger.

Biblio : SMF 2002 Tome 118 ; fasc 1 : 12-15