








***Galerina uncialis***  
(Britzelmayr) Kühner



Spores verruqueuses



Basides 22-32 x 8-11 µm



**Systematique**


**Division**  
Basidiomycètes

**Classe**  
Agaricomycètes

**Ordre**  
Agaricales

**Famille**  
Cortinariacées


Plage hilaire lisse




**Spores calyptrées**


Spore dont la membrane extérieure (épispore) flotte légèrement.  
*Du grec calyptra = voile de femme*

Spores légèrement calyptrées





A défaut de considérer deux caractères spécifiques, la forme des cheilocystides et l'absence de pleurocystides, les méandres de la détermination peuvent sembler ingrats.  
Ne pas confondre avec *Galerina marginata*, mortelle, plus robuste, avec un petit anneau marqué.



**Etymologie**  
Du latin *galerus* = bonnet, *uncia* = once (petite mesure de poids).  
***Galerina uncialis*** : bonnet petit comme une once.

Cette *Galerina* est **saprophyte**, elle se nourrit de débris de végétaux en décomposition, tiges herbacées ou bois mort.

**Détermination**  
La couleur rouille dominante, y compris sur la trace annulaire, oriente vers les Cortinariacées.  
Avec la clé de Marcel Bon, DM 84, suivre :  
*Spores verruqueuses*, lames ternes, épicutis banal, cheilos remarquables, spores avec plage lisse, chapeau hémisphérique, *cheilos effilées*,  
**Genre *Galerina***  
*Boucles*, plage lisse, pas de pore germinatif, *pas de pleurocystides*,  
**Sous-genre *Mycenopsis***  
*Epispore non boursouflée* mais verrues saillantes, *cheilos lagéniformes non capitées*,  
**Section *Mycenopsis***  
*Spores verruqueuses*,  
**Stirpe *Hypnorum***  
*Voile annuliforme*, tétrasporie  
***Galerina uncialis***