



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius rufolivaceus (Pers.:Fr.)Fr.

Nom français : Cortinaire roux olivacé

Sous feuillus, surtout sous chênes et hêtres sur sol calcaire. Chapeau visqueux, d'abord gris lilacin à beige lilacin, rapidement envahi de roux cuivré ou roux vineux par le centre. Lames vert olive ou violacées. Stipe blanchâtre plus ou moins violacé, avec un bulbe marginé ourlé de voile vineux. Chair blanchâtre ou violacée. Odeur et saveur sans particularité. KOH vert olive puis pourpré sur cuticule et chair. Spores 10,5-12,5 x 6,5-7,5 µm.

A noter l'existence de deux variétés, *C. rufolivaceus* var. *pallidus* et var. *vinosus*, la première distinguant les exemplaires à chapeau restant pâle, la seconde ceux à lames violacées ; il semble clair aujourd'hui qu'il s'agit-là tout simplement de la variabilité du taxon. Par contre, sous conifères (montagnards seulement ?), pousse *C. cupreorufus* (égal *C. orichalceus*), sosie à chapeau gris-vert évoluant en pourpre à brun-rouge.

Sans qu'il soit très fréquent dans notre région, il est possible de rencontrer ce cortinaire presque tous les automnes, précisément entre les mois de septembre et de novembre. A noter nos récoltes aux teintes plus ou moins violacées montrant bien l'inutilité de tenter de différencier des variétés.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- GEPR p. 736.

