



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Sarcodon quercinofibulatus M.A. Pérez-de-Gregorio, N. Macau & J. Careó

Sous chênes et hêtres. Espèce de création récente (2011). Chapeau brunâtre à brun gris, couvert d'écailles dressées. Aiguillons crème grisâtre. Chair blanc crème. Saveur douce à légèrement amère. KOH gris vert sur la chair. Spores d'une moyenne de $7 \times 6 \mu\text{m}$ et hyphes bouclées aux cloisons dans toutes les parties du champignon. A comparer avec quelques espèces fortement ressemblantes :

- *S. imbricatus* : lié aux épicéas ;
- *S. scabrosus* : sous feuillus, base du stipe verte, vert au KOH sur chair et dépourvu de boucles ;
- *S. squamosus* : lié aux pins.

Nous avons observé l'exemplaire présenté ici en août 2011, sous chênes, sur la commune de Port d'Envaux. Par le passé, ce *Sarcodon* a déjà été observé par des collègues dans cette forêt, mais il était nommé *S. imbricatus*, faute de mieux avec la littérature de l'époque ...

Biblio : Revista Catalana de Micologia, vol. 33: 25-30; 2011.

Fiche réalisée en juillet 2012 par Patrice TANCHAUD