



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Armillaria lutea Gillet

Synonymes : *A. bulbosa*, *A. gallica*

Nom français : Armillaire bulbeuse

Normalement isolés, ou en petit nombre, à terre, mais en relation avec le bois par les rhizomorphes. Chapeau brun ochracé à brunâtre, couvert de mèches brun-jaune, marge peu striée. Stipe brun-jaune en bas, fibrillo-floconneux de jaune, bulbeux clavé ; anneau fugace, blanc, frangé de jaune. Spores 7,5-10 x 5-6 µm, boucles présentes aux cloisons des hyphes.

A comparer surtout avec *A. cepistipes*, à chapeau plus strié et stipe moins bulbeux à anneau blanc.

Ce genre comporte peu d'espèces mais elles sont souvent délicates à séparer, il est évident que des spécimens frais et à différents stades peuvent faciliter l'identification. Les dimensions sporales ne sont d'aucun secours, toutes les espèces présentent des boucles aux cloisons, sauf *A. mellea* et *A. griseofusca*.

Espèce fréquente et assez remarquable, visible chaque automne, particulièrement entre les mois d'octobre et de novembre, en forêts de feuillus ou de conifères.

Biblio : littérature courante.