



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

## ***Rhodocybe gemina* var. *mauretunica*** (Maire)Bon

Cette variété diffère du type par son aspect plus grêle, « clitocyboïde », et son chapeau ne dépassant pas 5 cm. Comme chez le type, le stipe peut être pourvu de rhizoïdes, son odeur est subnulle à farineuse et ses spores mesurent 5,5-7 x 4-5 µm.

Des récoltes avec de nets rhizoïdes, comme sur la photographie ci-contre, pourraient être nommées *R. gemina* f. *subvermicularis*, mais la distinction entre ces variétés et formes semble bien délicate, cette forme étant d'ailleurs absente chez de nombreux auteurs.

A comparer malgré tout avec *Clitocybe vermicularis*, espèce printanière fort ressemblante, à sporée blanche (rose brunâtre chez les *Rhodocybe*) et spores plus petites.

Nous rattachons sous ce nom de *variété mauretunica* les récoltes de petits exemplaires difficiles à rapprocher du type, qui est d'aspect « tricholomoïde ». A ce jour nos récoltes ont été réalisées l'automne, sur le littoral et à l'intérieur des terres.

Biblio : DM 78 (1990) - Cetto n° 2716.

*Fiche réalisée en mai 2016 par Patrice TANCHAUD*