



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## ***Leucoagaricus subolivaceus*** Migl. & Per.

Sur sol sablonneux du littoral. Chapeau vert bronze vite décolorant et parfois craquelé, disque plus sombre avec plus ou moins de restes de voile blanc. Lames blanches. Stipe blanc avec anneau concolore. Spores 8-10 x 4,5-5,5  $\mu\text{m}$  à sommet typiquement étiré. Cheilocystides à sommet plus ou moins cristallifère. Aucune réaction à l'ammoniaque sur la cuticule.

A comparer avec *L. subvolvatus* f. *pictus* (cf. fiche *L. subvolvatus*) : chapeau blanc avec le disque seulement qui est brun olivacé, spores elliptiques à ovoïdes.

Comme l'écrit M. Jacques Guinberteau, il s'agit là d'une rare espèce connue des côtes charentaises. Nous la rencontrons occasionnellement, l'automne ou en début d'hiver, dans des écologies diverses telles que sous cyprès, tamaris et mimosas, parfois dans la dune, sur les îles de Ré et d'Oléron.

Biblio : DM HS n° 3 p. 101 - Champignons des dunes J. Guinberteau.

*Fiche réalisée en février 2024 par Patrice TANCHAUD*



