



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr.

Nom français : Coprin micacé

Croissance fasciculée sur souches et débris de feuillus. Chapeau à flocons blancs, surtout dans le jeune âge. Microscopie présentant des spores plus ou moins mitriformes et des soies sur le stipe.

A comparer (notamment au microscope) avec les espèces proches de la même section.

Cette espèce est fréquente mais nous hésitons souvent à la nommer sur le terrain en raison de ses sosies qui eux sont nettement plus rares, mis à part *C. saccharinus*. Un contrôle microscopique peut néanmoins rapidement lever le doute. Nous proposons un tableau comparatif ci-dessous, issu de la littérature à notre disposition.

Biblio : littérature courante

Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrard Ludwig, Pilzkompandium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 294 - Mille et un champignons P. Roux.

Section *Micacei* : en touffe sur les souches. Voile granuleux composé de sphérocytes.

Synthèse ouvrages Uljé, M. Citérin, P. Roux, E. Ludwig & BK4

	<i>soies stipe</i>	<i>spores</i>	<i>flocons voile piléique</i>	<i>fréquence</i>	<i>observations</i>
<i>micaceus</i>	oui	nettement mitriformes	brunâtre au centre du chapeau, fugace et souvent peu visible	commun	le seul avec voile peu visible et spores mitriformes
<i>pallidissimus</i>	oui	elliptiques	voile se rompant en petites écailles brunâtres au centre du chapeau	très rare	couleurs pâles. Voile écailleux. Cheilos et pleuros nombreuses
<i>saccharinus</i>	non	submitriformes - brun foncé	blanc pur sur tout le chapeau	peu fréquent	chapeau entièrement recouvert de flocons blancs
<i>truncorum</i>	non	submitriformes - brun clair	brunâtre au centre du chapeau	rare	voile teinté de brun au centre du chapeau

