



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

Agaricus pseudopraterensis (Bohus)Wass.

Dans les pelouses dunaires stabilisées et rudéralisées. Espèce de la section *Xanthodermatei*. Chapeau finement méchuleux cilié radialement, gris cendre à bistre sépia sur fond pâle. Anneau pulpeux, muni à sa face inférieure de quelques flocons marginaux, coloré bistre sépia enfumé et crénelé. Jaunissement faible, presque uniquement à la base du stipe sur une coupe, puis devenant rouge vineux par oxydation. Odeur légèrement phénolique mais nette. Spores 5-7 x 4-5,5 µm. Difficile à distinguer d'*Agaricus xanthodermulus* et *Agaricus parvitigrinus*.

A ce jour, nous n'avons observé cette espèce que sur l'île d'Oléron, dans le secteur d'Avail, en novembre 2009 (photographie ci-contre). Nous remercions M. Jacques Guinberteau pour son aide à la détermination de cette récolte et pour son envoi des photographies présentées ci-dessus qui montrent bien les détails de cet agaric.

Biblio : Galli p. 197 - Champignons des dunes Jacques Guinberteau.

Fiche réalisée en janvier 2017 par Patrice TANCHAUD