



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe dulcamara (Alb. & Schw.) Kummer

Nom français : Inocybe doux amer

Sous feuillus ou conifères. Chapeau feutré squamuleux, brun jaunâtre, fauvâtre à roussâtre. Lames jaunâtres puis brunes. Stipe ochracé, fibrillo-laineux à cortine faible. Odeur miellée. Saveur douce à faiblement amère. Spores lisses 8-10 x 5-6 µm.

En réalité, cet *Inocybe* semble avoir disparu des études récentes, nous conservons donc cette fiche pour mémoire. Reste à savoir quelles espèces poussent dans notre région ? De nouvelles récoltes ne seront pas superflues, peut-être faudra-t-il envisager les binômes suivants :

- *I. agardhii* : stipe nettement cortiné et odeur herbacée ou terreuse ;
- *I. malenconii* : chapeau vivement coloré et spores très cylindriques et peu larges ;
- *I. latispora* : souvent sous saules ou bouleaux, chapeau orange-fauve, squamuleux à crevassé, spores plus larges (9-10 x 6,5-7,5 µm).

Observer ces *Inocybe* en forêt est chose fréquente une grande partie de l'année, parfois dès le mois de mars, puis les mois d'été et d'automne, voire jusqu'en décembre. Dans l'attente d'y voir éventuellement plus clair un jour, nous conservons nos récoltes sous le binôme ici décrit et bien connu de tous.

Biblio : littérature courante - *Inocybe* J. Stangl - DM n°105 p. 22.



cheilos

