



Magnac-Lavalette (16), août 2014



Pessines, mai 2015



Magnac-Lavalette (16), août 2014

Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## *Tricholomopsis flammula* Métrod ex Holec


Sur conifères (surtout épicéa et sapin), parfois sur hêtre. Chapeau 3-8(11) cm, densément couvert dans la jeunesse de fines méchules rouge violet à pourpre brun, s'éclaircissant à maturité. Lames jaunes. Stipe jaune plus ou moins vif parfois couvert au début de fibrilles concolores au chapeau. Spores 5,5-8 x 3,2-4,8  $\mu\text{m}$ . A comparer avec

- *T. rutilans* : souvent plus grand et plus trapu, plus vivement coloré, stipe toujours fibrilleux de rouge violet, spores plus larges mesurant 5-8,5 x 4-6,5  $\mu\text{m}$  ;
- *T. decora* : méchules du chapeau sans teintes rouges ou violettes.


A ce jour, nous n'avons repéré cette espèce que sur deux stations, sur pin à Magnac-Lavalette et sur épicéa à Pessines. Les spores observées mesuraient 5,5-8 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$ .

Biblio : Mycotaxon 121, p.81-92, 2012.

*Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD*



**cheilos**



**Magnac-Lavalette (16), août 2014**



**Magnac-Lavalette (16), août 2014**