



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray

Synonyme : *Leccinum quercinum*

Nom français : Bolet des chênes

Il est à noter que ce changement de nom ne fait pas l'unanimité, non pas sur le fond car les éléments avancés paraissent tout à fait légitimes, mais sur la forme. En effet, *L. aurantiacum* (qui désignait auparavant « notre bon vieux » bolet orangé poussant sous peupliers) remplace maintenant *L. quercinum* lequel a été déclaré non valide en l'absence de diagnose latine ; *L. aurantiacum* devient donc très ambigu et il est indispensable d'ajouter après le binôme, le sens de l'auteur auquel on l'entend. En résumé et comme aide-mémoire :

- ***Leccinum albstipitatum*** (ex *L. aurantiacum*) = bolet orangé des peupliers
- ***Leccinum aurantiacum*** (ex *L. quercinum*) = bolet des chênes (mais parfois sous d'autres essences).

Surtout sous chênes, parfois sous peupliers et bouleaux et exceptionnellement sous saules, tilleuls ou hêtres. Chapeau brun orangé à rouge brique. Pores blancs puis bruns. Stipe méchuleux de roux puis brun noirâtre sur fond blanchâtre. Spores 14-20 x 4-6 µm.

Ce « pible » (appellation locale) n'est pas rare chaque automne dans notre région, il peut se rencontrer dès l'été lorsque les conditions sont favorables, ainsi que tardivement l'hiver.

Biblio : Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4) - GEPR p. 68 - *Funga nordica*.

Fiche réalisée en juillet 2018 par Patrice TANCHAUD



