



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum scabrum (Bull. : Fr.) S.F.Gray

Nom français : Bolet rude

Sous bouleaux. Chapeau brun châtain à brun ochracé. Pores blanchâtres puis ochracé grisâtre. Stipe méchuleux de gris brunâtre sur fond blanchâtre. Chair blanchâtre, subimmuable, sans trace de bleu-vert à la base. Réaction gris bleuâtre au sulfate de fer. Spores 15-20 x 5-7 µm.

H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos synonymisent *L. avellaneum*, *L. rigidipes* et *L. roseofractum*, dans l'immédiat nous préférons conserver ce dernier taxon pour les « *Leccinum scabrum* » à chair rosissante, en nous demandant si une forme ne pourrait pas être conservée ...

Ce bolet est assez fréquent, il est présent dans de nombreux secteurs où existe son essence de prédilection ; selon les conditions météorologiques il est parfois possible de l'observer dès l'été, mais plus souvent à la période automnale.

Biblio : Littérature courante - Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4) - GEPR.

