



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

## ***Hydnocystis clausa*** (Tul. & C. Tul.) Ceruti

Synonyme : *Geopora clausa*

Fructification hypogée à semi-hypogée, globuleuse, subglobuleuse à cérébriforme ; surface externe brune, verruqueuse ; intérieur blanc grisâtre. Odeur fortement fruitée, dite de dattes ou d'huile de noix. Spores 19-26 x 14-21 µm.

A noter l'existence d'*H. piligera*, espèce méditerranéenne qui a également une forte odeur fruitée, ses spores sont rondes et mesurent 28-35 µm.

Cette espèce est connue sur notre littoral charentais pour avoir été observée par des collègues à plusieurs reprises (îles d'Oléron et de Ré, forêt de la Coubre). Les récoltes présentées ici ont été réalisées lors des mois de décembre et de janvier, entre 2012 et 2016, avec des exemplaires toujours nettement apparents à la surface du sol, sur différents emplacements à Ronces les Bains et à la Pointe espagnole, nous faisant penser que cette espèce n'y est probablement pas très rare.

Biblio : *Funghi ipogei d'Europa*, Montecchi & Sarasini (2005) - Bull. SMMA n° 27 (2009).

*Fiche réalisée en août 2018 par Patrice TANCHAUD*

