



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## *Hemimycena mauretanicus* (Maire) Singer

Sur débris végétaux, bois pourrissant, etc. Petite espèce retenant parfois les gouttelettes (comme *H. cephalotricha* et *H. tortuosa*). Chapeau 1-2,5 mm, blanc. Lames plus ou moins bien formées n'atteignant pas la marge du chapeau. Spores 6,5-10 x 2-3,5 µm, basides tétrasporiques, piléocystides et caulocystides allongées, hyphes piléiques typiquement diverticulées. A comparer surtout avec : *H. angustispora* : chapeau allant jusqu'à 15 mm, stipe plus long, jaunissant à la base, lames nettement développées et différences microscopiques pas toujours évidentes dont le caractère essentiel est l'absence de diverticules sur les hyphes piléiques. Egalement, plusieurs variétés ont été décrites, signalons ici :

- *H. mauretanicus* var. *microcephala* : possède des piléocystides et des caulocystides capitées ;
- *H. mauretanicus* var. *cystidiata* : présente de nombreuses cheilocystides.

Nous avons plusieurs récoltes, provenant de divers secteurs de la région, se rapportant à cette espèce, réalisées sur feuilles, oyats et bois, s'échelonnant sur une période allant du mois d'avril à novembre.

Biblio : A monograph of the genera *Hemimycena*, *Delicatula*... in Europe de V. Antonin et M.E. Noordeloos.

