



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula chloroides (Krombholz) Bresadola

Noms français : Russule verdâtre ; Russule à lames glauques

Sous feuillus. Chapeau blanc vite taché de jaunâtre ochracé. Lames blanches souvent avec un reflet glauque, serrées, étroites (par rapport à l'épaisseur de la chair lors d'une coupe). Stipe parfois orné d'un cerne vert pâle au sommet. Odeur fruitée forte, saveur désagréable à piquante dans les lames. Sporée 1b. Spores 9-11 x 6-9 µm à verrues assez hautes.

Dans le cas de récoltes peu typiques, seul un ensemble de caractères avec contrôle des spores peut permettre de séparer cette espèce de deux autres proches qui sont *R. chloroides* var. *trachyspora* et *R. delica* (cf. cette fiche pour comparatif), lesquelles ont néanmoins une saveur douce.

Cette russule, lorsqu'elle se présente sous un aspect typique, ce qui est souvent le cas, ne présente aucune difficulté de détermination ; elle est visible chaque automne sur nos secteurs de prospection, également l'été lorsque les conditions météorologiques le permettent et même parfois dès le mois de mai.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula Sarnari* - GEPR p. 162.

