



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula risigallina (Batsch) Saccardo

Synonymes : *R. chamaeleontina*, *R. lutea* ss. *auct.*

Nom français : Russule caméléon

Surtout sous feuillus. Chapeau 2-5 cm, fragile et sec, de couleurs variables : rose ou rose-rouge à la marge et centre jaune ochracé, ou totalement jaune, ou panaché de rouge et de jaune (ces variations ayant fait l'objet de plusieurs formes aujourd'hui placées en synonymie du type : par exemple *f. luteorosella*, *f. chamaeleontina*, *f. lutea* et *f. bicolor*). Lames jaunes puis jaune orangé vif. Stipe blanc. Odeur fruitée agréable, pouvant rappeler la mirabelle ou l'abricot. Saveur douce. Gaïac vif et rapide sur stipe et lames. Sporée 4d. Spores 7-9 x 6-7,5 µm à verrues isolées.

A comparer avec quelques espèces proches de la même section *Chamaeleontinae*, notamment :

- *R. acetolens* (syn. *R. vitellina*, *R. lutea* ss. *auct.*) : plutôt sur sol acide, chapeau jaune vif, odeur vinaigrée avec l'âge, gaïac faible à peu intense ;
- *R. ochracea* : chapeau 4-7 cm, inodore, gaïac faible ;
- *R. helios* : sous chênes méditerranéens, chapeau 5-10 cm, gaïac nul à faible, spores zébrées à subréticulées.

Cette petite russule est visible chaque année, elle est souvent précoce et peut apparaître dès le mois de juin, puis l'été et encore l'automne jusqu'en novembre.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula* Sarnari.



