



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raith.

Nom français : Omphale bibelot

Parmi les mousses ou les sphaignes, en forêt ou pelouse. Chapeau orangé plus ou moins vif, parfois décoloré, vite creusé au centre. Lames blanches, décurrentes. Stipe concolore au chapeau, finement velu (loupe). Spores 5-6 x 2-2,5 µm, cystides présentes.

A ne pas confondre avec *Mycena acicula* qui est plus petit, avec l'insertion des lames différente.

Attention également à une rare espèce, *Leucoinocybe taniae* (syn. *Clitocybula taniae*, *Pseudoomphalina flavoaurantia*), qui pousse en milieux sablonneux et herbeux, à chapeau omphaloïde, strié, brun à fauve orangé avec le centre plus sombre, lames décurrentes, sans odeur particulière, spores 6-8 x 5-7 nettement amyloïdes, et présente des cystides lagéniformes à long col sur les lames, le stipe et la cuticule.

Espèce fréquente et visible à tous moments de l'année qui ne pose pas de problème d'identification, mais qui peut s'avérer trompeuse lorsque, avec l'âge, elle perd ses couleurs comme sur les photographies (cf. page 2).

Biblio : littérature courante.



