



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

Pulvinula johannis Lantieri

Sous conifères. Apothécies plus ou moins regroupées, irrégulièrement cupulées, jusqu'à 5 mm, de couleur saumoné rosâtre à orangées. Spores 9-11(11,5) μm avec une grosse guttule ou de nombreuses petites. Asques 170-200 x 12-14,5 μm avec crochets à la base. Paraphyses filiformes à sommet courbé.

A comparer notamment avec deux espèces aux dimensions sporales légèrement plus petites, avec paraphyses majoritairement bifurquées et poussant plutôt en milieu brûlé, *P. archeri* et *P. pyrophila*.

Cet ascomycète est probablement rare puisqu'il n'était connu, au moment de sa description (2008), que de la localité type en Sicile. Nous l'avons observé sur plusieurs emplacements, parfois par centaines d'exemplaires, sur les communes de Champagne, Pessines, Chenac St Seurin d'Uzet et sur l'île d'Aix, toujours sous *Cupressus* entre les mois de novembre et janvier. Il est à noter que nous n'avons jamais observé de spore avec une grosse guttule, contrairement à ce qui est noté dans la description initiale, mais nous ne voyons pas d'autre taxon auquel nos récoltes pourraient se rattacher.

Biblio : Sydowia 60(2): 248 (2008).



